

FOVAL GEL ULTRA – FOVAL GEL PLUS

ESCA INSETTICIDA IN GEL PRONTA ALL'USO

Tipo di prodotto: PT18 (Insetticida)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00515/AUT

Categoria di utilizzatori: Non professionali

Composizione:

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)	0,01 %
Bitrex® (denatonio benzoato)	0,008 %
Coformulanti q.b. a	100 %

Peso netto: 10 g

Titolare dell'autorizzazione ed officina di produzione: MYLVA S.A. - Via Augusta, 48 - 08006
Barcellona (Spagna) - Tel. +34 93 760 14 71

Distribuito da: KOLLANT S.r.l. – Via C. Colombo,7/7A - 30030 Vigonovo (VE)

Lotto N. / del.: vedi timbro

Validità: 36 mesi



Indicazioni di pericolo:

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.

Misure di primo soccorso: In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario, portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando possibile. Non lasciare sola la persona intossicata.

Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.

IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

Misure di protezione ambientale: Evitare la contaminazione di scarichi, sistemi idrici superficiali e sotterranei, nonché del suolo. Recuperare il prodotto dalla superficie interessata e l'acqua di lavaggio utilizzata per il trattamento. In caso di fuoriuscita di acqua, evitare la diffusione utilizzando adeguati dispositivi di barriera. Il prodotto recuperato deve essere eliminato in conformità alla legislazione locale. Contattare le autorità competenti se la situazione non può essere controllata.

Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio: Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e gli appositi contenitori per esche secondo la normativa vigente.

FOVAL GEL PLUS è un insetticida in formulazione gel può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati). Il prodotto può essere posto all'interno di stazioni di adescamento.

Modalità d'impiego: L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche. La trappola FOVAL GEL PLUS deve essere applicata nelle aree in cui le formiche sono presenti, in prossimità dei nidi o presso i loro percorsi. Per utilizzo in esterni (terrazze, pati, cortili o giardini), l'erogatore va posizionato nei posti di maggiore presenza: grondaie, cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature.

- 1) Attivare l'erogatore premendo la capsula fino a completo svuotamento del gel;
- 2) Posizionare la trappola nei luoghi consigliati.

Dose: Dose: 0,4 - 0,9 g / m². Per raggiungere il dosaggio sopra indicato, collocare gli erogatori, contenenti 5 g di gel ciascuno, ogni 5-10 m² in funzione del livello di infestazione (basso/alto).

Frequenza di applicazione: dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare gli erogatori e sostituirli se l'esca risulta consumata e l'infestazione persiste.

Frequenza del trattamento: il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.

Misure di mitigazione del rischio: Non applicare in aree recentemente trattate con altri insetticidi. Per evitare fenomeni di resistenza, è consigliabile alternare trattamenti con prodotti basati su principi attivi con meccanismo d'azione differente. Il prodotto va utilizzato solo fino a completo controllo dell'infestazione. Usare il prodotto alle dosi e agli intervalli raccomandati. Per evitare rischi per l'ambiente, seguire le istruzioni e le modalità d'uso. Nel caso di applicazione attorno agli edifici, evitare l'applicazione nei pressi di scarichi o sistemi fognari. Nel caso di trattamenti in zone connesse a sistemi fognari, assicurarsi che il prodotto sia applicato in aree non soggette a rischio di esondazione o con ristagni d'acqua, in punti non raggiungibili dalla pioggia, da acque di lavaggio o da possibile dilavamento. Il prodotto deve essere applicato in modo sicuro per minimizzare il rischio di ingestione da parte di bambini o

animali non bersaglio. Non gettare il prodotto a terra, in corsi d'acqua, nel lavandino o in scarichi fognari. Non applicare su superfici o utensili che possono essere a contatto con mangimi / alimenti.

Condizioni di stoccaggio e validità del prodotto: il prodotto è stabile, all'interno del contenitore originale, fino a 3 anni se conservato in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. E' raccomandabile conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

TESTO PER TRAPPOLINA

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2018/00515/AUT

Composizione:

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)	0,01 %
Bitrex® (denatonio benzoato)	0,008 %
Coformulanti q.b.a	100 %

Contenuto: 10 gr

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.

