

ENERVIN® DUO

Fungicida
Sospensione Concentrata (SC)

ENERVIN® DUO

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

AMETOCTRADINA pura g 27,0 (=300 g/l)

DIMETOMORF puro g 20,3 (=225 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONE.

Può provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A.

Via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania

BASF Espanola S.L - 43080 Tarragona, Spagna

BASF Agri-Production S.A.S. - 69727 Genay Cedex, Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N.14697 del 23.01.2012

Contenuto netto: 0,8 - 1 - 4 - 5 - 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su vite.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione intervenire con terapia sintomatica.

Consultare un centro antiveneni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ENERVIN DUO contiene le sostanze attive ametoctradina e dimetomorf con meccanismo d'azione diverso.

ENERVIN DUO è indicato per il controllo della peronospora di vite, pomodoro, patata, cucurbitacee, lattughe.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

ENERVIN DUO deve essere applicato preventivamente nei periodi critici di sviluppo della peronospora.

Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Si

raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella).

Coltura	Malattia	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno sulla coltura indicata e nell'appezzamento (*)
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,8-1,0	10-14	3(**)
Patata in pieno campo	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,8	5-10	3
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,8	7-10	3
Lattughe (inclusa Lattuga baby leaf) in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	0,8	7-10	2
Cetriolo in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,8	7-10	2
Zucchino in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,8	7-10	2
Melone in pieno campo	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,8	7-10	2

(*) Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti ametoctradina sulla coltura e nell'appezzamento trattato per un numero di volte superiore a quello indicato; nel conteggio ricadono anche i trattamenti su eventuali colture in avvicendamento.

(**) Su vite effettuare al massimo 3 applicazioni all'anno e non più di due trattamenti consecutivi. Eseguire il terzo trattamento dopo la fioritura.

- Con alta pressione della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario rispettare gli intervalli più brevi tra i trattamenti.
- Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.
- Si consiglia l'impiego di **ENERVIN DUO** nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ

ENERVIN DUO è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ

ENERVIN DUO, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà sin qui saggiate. In ogni caso, su varietà nuove e/o in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di eseguire saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PATATA, LATTUGHE; 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, CETRIOLO, ZUCCHINO E MELONE; 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 07.12.2016