

RIVIERA MZ

**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)**

RIVIERA MZ

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13784 del 03.07.2007

Composizione:

Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE
KOLLANT S.r.l. - Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Distributore:

SIVAM S.p.A.- Casalpusterlengo (LO)
GREEN RAVENNA S.r.l. - Ravenna (RA)
AGRISYSTEM S.r.l. - Lamezia Terme (CZ)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Milano (MI)

Taglie:

1 Kg (4 sacchetti da 250 gr)
1 Kg (2 sacchetti da 500 gr)
5 Kg (10 sacchetti da 500 gr)
5 Kg (5 sacchetti 1Kg)
10 Kg (20 sacchetti da 500 gr)
10 Kg (10 sacchetti da 1Kg)

Partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

NORME PRECAUZIONALI

Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Dimetomorf: ---

Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmaticiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: ---

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.

Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di coperura.

Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite (*Phomopsis viticola*).

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: contro *Peronospora (Plasmopara viticola)* 200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha) iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.

Pomodoro, Patata: In pieno campo, contro *Peronospora (Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha) iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).


Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

Sacchetti Idrosolubili: AVVERTENZE PARTICOLARI




Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati



Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore



Introdurre nella botte il necessario o numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto



Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione



Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO

Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

RIVIERA MZ

**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)**

RIVIERA MZ

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13784 del 03.07.2007

Composizione:

Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

**ATTENZIONE**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361D - Sospettato di nuocere al feto.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE
KOLLANT S.r.l. - Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)
ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Distributore:

SIVAM S.p.A.- Casalpusterleno (LO)
GREEN RAVENNA S.r.l. - Ravenna (RA)
AGRISYSTEM S.r.l. - Lamezia Terme (CZ)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Milano (MI)

Taglie: 50-100-150-250-500-750 g; 1-5-10-20-25 kg
Partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%;

“Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16.09.2015 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 13.02.2018”

Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Dimetomorf: ---

Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica.

Controindicazioni: ---

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.

Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di copertura.

Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporente ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite (*Phomopsis viticola*).

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: contro *Peronospora (Plasmopara viticola)* 200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha) iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.

Pomodoro, Patata: In pieno campo, contro *Peronospora (Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha) iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

RIVIERA MZ

**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)**

RIVIERA MZ

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13784 del 03.07.2007

Composizione:

Dimetomorf puro 9 g

Mancozeb puro 60 g

Coformulanti q. b. a 100 g



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)

Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)

ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE

KOLLANT S.r.l. - Maniago (PN)

SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)

ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT)

Distributore:

SIVAM S.p.A.- Casalpuusterlengo (LO)

GREEN RAVENNA S.r.l. - Ravenna (RA)

AGRISYSTEM S.r.l. - Lamezia Terme (CZ)

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Milano (MI)

Taglie: 50-100 g

Partita n. vedi timbro

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O
L'ASTUCCIO ESTERNO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Etichetta ridotta per confezioni in sacchetti idrosolubili

RIVIERA MZ

**FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)**

RIVIERA MZ

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13784 del 03.07.2007

Composizione:

Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g



ATTENZIONE

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

250 – 500 g; 1 kg

Distributore:

SIVAM S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna (RA)
AGRISYSTEM S.r.l. – Lamezia Terme (CZ)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Milano (MI)

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere né conservare fuori dalla confezione.