

# BETAFIL FL

DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DI BARBABIETOLA  
DA ZUCCHERO, DA ORTO E DA FORAGGIO  
SOSPENSIONE CONCENTRATA

## COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:

FENMEDIFAM puro	g 15,9
Coformulanti q. b. a	g 100



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208. Contiene formaldeide. Può provocare una reazione allergica. EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P273. Non disperdere nell'ambiente. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione vigente.

## Titolare dell'autorizzazione:

**UPL EuropeLtd**

The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925 819999

**Autorizzazione del Ministero della Salute n. 6001 del 27/06/1984**

## Stabilimenti di produzione:

CHEMIA S.P.A. – Strada Statale n.255 km 46 – Sant'agostino (FE)  
UPL Europe Ltd. Sandbach, Cheshire CW113QQ – Gran Bretagna  
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda)

## Distribuito da:

UPL ITALIA – Via Terni 275 – Loc.San Carlo – 47522 Cesena (FC) – Tel.0547 661523.

CHEMIA S.P.A. – Strada Statale n.255 km 46 – Sant'agostino (FE)  
Tel. 0532 440977.

SIPCAM Italia – Via Sempione 195 – 20016 Pero (MI) –  
Tel. 02 35378400.

SCAM S.P.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena  
Tel. (+39) 059 586511

**Taglie:** mL 100-500; litri 1-2-3-5-10-20 **Partita n.:**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i canali di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

## MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

BETAFIL FL è un diserbante selettivo di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare di contatto sulle seguenti infestanti: Anagallis arvensis, Atriplex patula, Capsella bursa-pastoris, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Galinsoga parviflora, Lamium purpureum, Linaria minor, Matricaria spp., Myosotis arvensis, Papaver spp., Plantago major, Polygonum convolvulus, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Raphanus raphanistrum, Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Spergula arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica persicaria, Viola tricolor.

## BARBABIETOLA A SEMINA PRIMAVERILE

Impiegato in post-emergenza della coltura con le erbe infestanti in fase di attiva crescita, con massimo 2 foglie vere, a litri 6-8 per ettaro in 250-400 litri di acqua sulle infestanti asciutte e con temperature massime di 25°C, altrimenti si possono verificare delle ustioni. Si possono effettuare, inoltre, le seguenti miscele:

-litri 5 addizionato a prodotti a base di Etofumesate a litri 0,950-1,150 per ettaro, in 250- 300 litri di acqua con infestazione di Polygonum persicaria, Solanum nigrum, Amaranthus spp., Polygonum aviculare, e infestanti graminacee non ancora accestite.

-litri 4 addizionato a Etofumesate litri 3 per ettaro, in 250-300 litri di acqua in presenza di infestanti con maggioranza graminacee quali Alopecurus, Avene, Digitaria, Panicum, Setaria che non siano in fase di accestimento.

Tenere presente che le miscele sopracitate debbono effettuarsi solo con barbabietole che abbiano 2-4 foglie vere e con la temperatura non superiore a 20-22°C.

## BARBABIETOLA A SEMINA AUTUNNALE

Litri 8 in 350-400 litri d'acqua, per ettaro, con infestazioni di Chenopodium, Papaver, polygonum convolvulus, Raphanus, Sinapis e tutte le infestanti sensibili.

Si possono effettuare, inoltre, le seguenti miscele:

-litri 5-6 addizionato a Etofumesate litri 1,40 per ettaro, in 250-300 litri di acqua in presenza di infestanti di Galium, Veronica, Fumaria, Stellaria e graminacee non ancora accestite; trattare con coltura allo stadio minimo di 2 foglie vere, con temperature sui 15 -20°C si ha il massimo assorbimento, se si tratta in giornate calde intervenire verso sera nelle ore più fresche; nel caso si verifichi una pioggia entro

le sei ore dal trattamento, l'effetto del prodotto può essere ridotto. Trattare con colture sane e non sofferenti per cause varie.

**COMPATIBILITÀ** - Non compatibile con prodotti a reazione alcalina.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE:** DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA; CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO; IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI; NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

# BETAFIL FL

DISERBANTE SELETTIVO PER IL DISERBO DI BARBABIETOLA  
DA ZUCCHERO, DA ORTO E DA FORAGGIO  
SOSPENSIONE CONCENTRATA

## COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:

FENMEDIFAM puro	g 15,9
Coformulanti q. b. a	g 100



## INDICAZIONI DI PERICOLO

H411. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH401. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P273. Non disperdere nell'ambiente. P391. Raccogliere il materiale  
fuoriuscito. P501. Smaltire il prodotto in conformità alla regolamen-  
tazione vigente.

## UPL EuropeLtd

The Centre Birchwood Park - Warrington WA3 6YN – tel. +44 1925  
819999

**Autorizzazione del Ministero della Salute n. 6001 del 27/06/1984**

## Stabilimenti di produzione:

CHEMIA S.P.A. – Strada Statale n.255 km 46 – Sant'agostino (FE)  
UPL Europe Ltd. Sandbach, Cheshire CW113QQ – Gran Bretagna  
CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda)

## Distribuito da:

UPL ITALIA – Via Terni 275 – Loc.San Carlo – 47522 Cesena  
(FC) – Tel.0547 661523.  
CHEMIA S.P.A. – Strada Statale n.255 km 46 – Sant'agostino (FE)  
Tel. 0532 440977.  
SIPCAM Italia – Via Sempione 195 – 20016 Pero (MI) –  
Tel. 02 35378400.  
SCAM S.P.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena  
Tel. (+39) 059 586511

**Taglie:** ml 100

**Partita n:**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il  
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione  
in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione  
attraverso i canali di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle  
strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - In caso di intossicazione chia-  
mare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avver-  
tenza: consultare un Centro Antiveleni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**Etichetta in formato ridotto per la taglia da 100 ml**