

# CENTURY® SL

**Fungicida sistemico per il controllo della  
Peronospora della VITE**

**Liquido solubile (SL)**

**CODICE FRAC: 33**

## CENTURY® SL

### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

**Fosfonato di potassio puro g 51,7 (= 755 g/L)**

corrispondente a 504 g/L di acido fosfonico/fosforoso equivalente

Coformulanti q. b. a g 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

**Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso.**

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd.**

3 Demetriou Vikella, Nicosia 1061, Cipro,

Tel. + 972 3 796 4300

### Officine di produzione:

Luxembourg Industries Ltd. 27 Hamered Street - Tel-Aviv, Israele

### Stabilimento di solo confezionamento:

S.T.I. SOLFOTECNICA Italiana – Cotignola, Ravenna

**Distribuito da:** BASF Italia S.p.A., Via Marconato 8, 20811  
Cesano Maderno (MB), Italia.

### PRODOTTO FITOSANITARIO

**Reg. del Ministero della Salute N. 16161 del 09.12.2014**

**Contenuto netto: ml 10-20-50-100-250-500, litri 1-2-4-5-6-8-10**

**Partita n.**

®Marchio registrato BASF

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti  
interventi di pronto soccorso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CENTURY SL è un fungicida sistemico attivo nei confronti dei fomiceti, in particolare contro quelli appartenenti alla famiglia delle peronosporacee. Il suo principio attivo è caratterizzato da una notevole mobilità nelle piante e la sua sistemicità si manifesta sia in modo ascendente sia in modo discendente. L'attività del formulato è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in attiva crescita permettendo, grazie alla sua sistemicità, di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente al trattamento.

### MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

**Vite:** contro Peronospora (*Plasmopora viticola*) in trattamenti preventivi alla dose di 300-400 ml/hl (max 4 L/ha) ad intervalli di 10 giorni.

Si consiglia l'uso di CENTURY SL nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'utilizzo di fungicidi di contatto, quali ftalimidi, carbammati o prodotti a base di rame. In tal caso si consiglia di impiegare la dose minima con intervallo fra le applicazioni di 12-14 giorni, in funzione della pressione di malattia.

Impiegare preferibilmente il prodotto dalla ripresa vegetativa alla pre-chiusura grappolo, e comunque non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

### COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità e fitotossicità.

Il prodotto non è compatibile con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico ed ammoniacale).

Non effettuare miscele con formulati oleosi e non irrorare il prodotto su colture precedentemente trattate con formulati oleosi perchè ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

# ETICHETTA e FOGLIO ILLUSTRATIVO per le confezioni di piccolo formato

## FORUM® 50 WP

FUNGICIDA  
POLVERE BAGNABILE

FRAC: H5 (CAA)

### FORUM® 50 WP

#### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

DIMETOMORF, puro g 50  
Coformulanti q. b. a g 100



#### INDICAZIONI DI PERICOLO

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

#### Officine di produzione

ISAGRO S.p.A. Via Nettunense, km 23,400 - 04011 Aprilia (LT)  
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Via Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA) (1)

#### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità  
n. 8542 del 30.11.1994

**Contenuto netto:** g 50 - 100 - 400 - 500 - kg 1 - 1,2 - 5

**Sacchetti idrosolubili:** g 500 (2 sacchetti da g 250)  
kg 1 (2 sacchetti da g 500)  
kg 1 (5 sacchetti da g 200)  
kg 1,2 (6 sacchetti da g 200)  
kg 2 (5 sacchetti da g 400)  
kg 5 (10 sacchetti da g 500)

#### Partita n.

® Marchio Registrato

(1) Officina autorizzata alla produzione di sacchetti idrosolubili

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

#### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Consultare un centro antiveleni.**

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose g/ha	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattam. (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	40-50	0,4-0,5	8 - 12	3
Garofano, gerbera	Marciume basale ( <i>Phytophthora</i> spp.)	50-60	-	10 - 12	3

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Si consiglia di usare il prodotto preventivamente nei periodi critici di sviluppo della peronospora.

Nel caso delle colture ornamentali (garofano e gerbera), intervenire a partire dalle prime fasi post-trapianto (volumi d'acqua consigliati: 1000-1500 l/ha).

Per evitare la comparsa di resistenza, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto in miscela con antiperonosporici dotati di differente meccanismo d'azione e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

#### COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida o insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

**Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima della raccolta per la VITE**

**ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29.09.2015 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29.09.2016