

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE l/ha
<p>Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro</p> <p>Drupacee: pesco (nettarina e percocha), ciliegio, susino</p> <p>Pomacee: melo, pero</p> <p>Fruttiferi da frutta a guscio: nociolo</p> <p>Olivo, Vite</p>	<p>Graminacee a nascita autunnale (<i>Avena spp.</i>, <i>Phalaris spp.</i>, <i>Alopecurus spp.</i>, <i>Bromus spp.</i> e ricacci di frumento e orzo) fino a inizio accestimento</p>	<p>0,75 - 1,0</p>
<p>Ortaggi: lattuga, cicoria, carciofo, cetriolo, melanzana, carota, ravanella, cipolla</p> <p>Fava da granella, fagiolino, fagiolo da granella, pisello. (Intervenire prima della fioritura)</p>	<p>Graminacee a nascita autunnale (<i>Lolium spp.</i>) fino a inizio accestimento</p>	<p>1,0 - 1,25</p>
<p>Patata</p> <p>Barbabietola da zucchero</p> <p>Oleaginose: girasole, soia, colza</p>	<p>Graminacee a nascita primaverile (<i>Echinochloa spp.</i>, <i>Setaria spp.</i>, <i>Digitaria spp.</i>) fino a inizio accestimento</p>	<p>1,25 - 2,0</p>
<p>Foraggiere leguminose: trifoglio</p> <p>Tabacco</p> <p>Melissa e valeriana *</p>	<p>Sorghetta da rizoma</p>	<p>2,0</p>
<p>Floreali in pieno campo ed in serra: rosa, garofano, liliacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia</p>		