

Colture	Avversità	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt.	Periodo carenza
Uva da tavola	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp.</i>)	125	1	Trattare a inizio fioritura.	1/anno	-
Pesco, Nettarine, Albicocco	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp.</i>)	100	1	Trattare a caduta petali.	1/anno	-
Melone, Cocomero, Zucca (pieno campo)	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp.</i>)	100	1	Trattare a inizio infestazione, e ripetere se necessario dopo 21 giorni.	2/ciclo	3 gg.
Pomodoro, Melanzana	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp.</i>)	125	1	Trattare a inizio infestazione.	1/ciclo	14 gg.
Lattughe e Scarola (pieno campo)	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp.</i>)	200	1	Trattare entro l'emissione della 4 ^a -6 ^a foglia.	1/ciclo	-
Colture ornamentali e floreali (Rosa, Crisantemo, Gerbera, Garofano)	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips spp.</i>)	100	1	Trattare a inizio infestazione.	1/ciclo	-