

## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	Dosi (kg/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Barbabietola da zucchero Colza Girasole Mais Patata Soia Sorgo Tabacco	Ferretto Nottue Bibione degli orti Centopiedi Punteruolo del cavolo Altica Delia Diabrotica Maggiolino comune Millepiedi Mosca della carota Scutigerella	12 - 15	Il prodotto può essere distribuito localizzato lungo la fila mediante microgranulatori, oppure a pieno campo (incorporare con una leggera erpicatura).  Per eventuali interventi a pieno campo le dosi vanno aumentate proporzionalmente in relazione alla maggior superficie da proteggere.	—
Frumento	Tipula	10 - 12	In previsione di forti attacchi parassitari, in particolare su patata ed altre solanacee,	
<b>Orticole:</b> asparago, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cocomero, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, navone, peperone, pisello, pomodoro, rapa, sedano		15 - 20	effettuare il trattamento in due tempi successivi: un primo alla semina/trapianto alla dose di 15 kg/ha ed un secondo alla sarchiatura/rincazzatura alla dose di 15 kg/ha.	
Floricole Ornamentali		4 - 7 g/m <sup>2</sup>		