

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno
Melo e pero	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> ; <i>Venturia pyrina</i>)	75 – 100	1,1 - 1,5	7 - 10	4
Vite da vino	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>); marciumi secondari	200	2 - 2,5	-	1
Vite da tavola	(<i>Aspergillus</i> spp.; <i>Penicillium</i> spp.)		2 - 2,5	14	3
Lattuga e scarola (in pieno campo e in serra)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 – 200	2	10 - 14	2
Peperone, cetriolino, cetriolo e zucchina (in serra)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 – 200	2	10 - 14	3
Fagiolino (in serra)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 – 200	1,5 - 2	10 - 14	2
Fragola (in pieno campo)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 – 200	2 - 2,5	7 – 14	3
Fragola (in serra)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 - 200	2	7 – 14	2
Pomodoro e melanzana (in pieno campo e in serra)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 – 200	2	10 – 14	3
Cipolla (in pieno campo)	Muffa grigia (<i>Botrytis</i> spp.)	150 – 200	2	10	3
Carota (in pieno campo)	Alternaria (<i>Alternaria dauci</i>) Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	200	2	10 – 14	2
Ciclamino (in pieno campo e in serra)	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 – 150	1,5 - 2,25	7 – 10	4