

FORCE®

Insetticida del terreno in formulazione microgranulare

per la protezione di barbabietola da zucchero, cereali, oleaginose, ortaggi, patata, tabacco, floreali ed ornamentali.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
teflutrin puro g 0,5
coformulanti q.b. a g 100



INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

- SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
- EXWORLD Technology Ltd, PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool, TS25 2BW (UK)

Registrazione Ministero della Salute n. 8189 del 16.03.93

Partita n. vedi corpo della confezione **kg 15**

Altro stabilimento di produzione:
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)

Altre taglie: kg 1 – 10 – 12 - 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro Antiveleeni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Durante la manipolazione del prodotto indossare maschera e guanti di gomma per evitare il contatto con la pelle. I granuli possono determinare l'insorgere di una sensazione cutanea che può manifestarsi fino a 4 ore dal contatto e durare da 2 a 24 ore. Non vi sono effetti ritardati. Dopo l'uso lavare le mani e la pelle eventualmente esposta prima di mangiare, bere, fumare e usare i servizi igienici. Lavare gli indumenti protettivi e l'equipaggiamento. Come di norma, prima delle usuali pratiche di manutenzione, pulire l'attrezzatura utilizzata per il trattamento. Non riutilizzare il contenitore.

CARATTERISTICHE

FORCE è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno. Il prodotto agisce per contatto e, nella fase di vapore, possiede una forte attività repellente che aumenta l'efficacia protettiva. FORCE è attivo a basse dosi e grazie al suo meccanismo d'azione, diverso rispetto ai prodotti organofosforici e carbammati, può anche risultare idoneo per le raccomandazioni tecniche che prevedono la rotazione nell'impiego dei geodisinfestanti.

MODALITA' D'IMPIEGO

A seconda della coltura e delle necessità aziendali, FORCE può essere applicato lungo la fila oppure a pieno campo. Normalmente FORCE si distribuisce al momento della semina con microgranulatori adeguatamente tarati; tuttavia, in mancanza di tali attrezzature, il prodotto può essere distribuito con altri mezzi adeguati in superficie e successivamente incorporato nel terreno con una leggera erpicatura (3-5 cm).

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Le dosi qui riportate si riferiscono a trattamenti da effettuarsi con i microgranulatori e lungo la fila della coltura. Per eventuali interventi a pieno campo le dosi vanno aumentate proporzionalmente in relazione alla maggior superficie da proteggere. Impiegare le dosi maggiori nelle aree ove sulle precedenti coltivazioni si sono già verificate significative infestazioni.

COLTURA	PARASSITI	DOSE kg/ha
Barbabietola da zucchero	Agriotes spp., Chaetocnema tibialis, Atomaria linearis, Scutigerella immaculata, Tipula spp.	12-15
Frumento	Bibio hortulans, Delia spp., Scutigerella immaculata, Tipula spp.	10-12
	Agriotes spp., Melolontha melolontha	12-15
Mais, Sorgo	Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp., Scutigerella immaculata, Tipula spp., Delia spp.	12-15
Girasole, Soia, Colza	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Delia spp.	12-15
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Rapa, Navone, Carota, Melone, Cocomero, Finocchio, Sedano, Asparago, Lattuga, Fagiolo, Fagiolino, Pisello	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Ceuthorynchus pleurostigma, Delia spp., Psila rosae, Tipula spp., Melolontha melolontha, Millipiede, Centopiede	15-20
Patata	Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp.	12-15
Tabacco	Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp.	12-15
Floreali ed Ornamentali	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Tipula spp., Melolontha melolontha, Centopiede, Millipiede	4-7 g/mq (pieno campo)

AVVERTENZA

In previsione di attacchi parassitari che si protraggono nel tempo ed in particolare nelle coltivazioni di patata, pomodoro, peperone, melanzana può risultare necessario effettuare il trattamento in due tempi successivi: un primo intervento alla semina/trapianto alla dose di 15 kg/ha ed il secondo alla sarchiatura/rincazzatura, sempre alla dose di 15 kg/ha.

Divieto di impiego in serra.

COMPATIBILITA'

Per l'uso raccomandato non è necessaria la miscela con altri antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITA'

Attenzione: Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri. La sostanza non è facilmente degradabile.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 marzo 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 1° ottobre 2014