

## Campi d'applicazione, dosi e modalità d'impiego

COLTURA	SPECIE PARASSITA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
<b>Vite</b> (da vino e da tavola)	Cicaline ( <i>Scaphoideus titanus</i> , <i>Empoasca spp.</i> , <i>Zygina rhamni</i> )	20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha)	Intervenire alla prima comparsa delle forme mobili	30 giorni
<b>Pesco, Susino</b>	Cicaline ( <i>Empoasca decedens ecc.</i> )	20-30 ml/hl (0,2-0,3 l/ha)	Intervenire alla prima comparsa delle forme mobili	Susino: 21 giorni  Pesco: 7 giorni
<b>Ortaggi</b> (Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Cipolla) <b>Fragola</b> (pieno campo e serra)	Tripidi ( <i>Frankliniella occidentalis ecc.</i> )	60 ml/hl (0,3 l/ha)	Intervenire ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni  Su fragola, intervenire al primo manifestarsi dell'attacco, bagnando accuratamente la zona dei fiori	Peperone, melanzana: 3 giorni  Altre colture: 7 giorni
<b>Lattuga</b> <b>Crescione, Dolcetta, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola</b> (pieno campo e serra)	Acari ( <i>Tetranychus urticae e Panonychus ulmi</i> ) Tripidi ( <i>Frankliniella occidentalis ecc.</i> ) Afidì ( <i>Myzus persicae ecc.</i> )	60 ml/hl (0,3 l/ha)	Alla comparsa dei fitofagi	14 giorni
<b>Colture Floricole ed Ornamentali</b> (pieno campo e serra)	Tripidi ( <i>Frankliniella occidentalis ecc.</i> ) Acari ( <i>Tetranychus urticae e Panonychus ulmi</i> )	60 ml/hl (0,3 l/ha)	Ad inizio infestazione ripetendo il trattamento dopo 4-6 giorni	Non richiesto